

血钾的快速逆转可导致低血钾，所以要密切监测钾离子浓度。

鉴于使用地高辛免疫Fab的经验有限，至今尚未报道本品出现过敏反应，但要充分认识其潜在的严重过敏性反应。由于地高辛免疫Fab仅仅是结合地高辛的抗体的一部分，所以它产生过敏反应的危险比完整的抗体分子要少。对于个别高敏性患者可适当地进行皮肤过敏试验，例如对绵羊蛋白过敏或以前应用过地高辛免疫Fab治疗的病人。然而对非高敏性患者不必按常规做过敏试验，因为需要紧急治疗时可延迟起始作用。

静脉注射地高辛免疫Fab的时间不得少于30分钟。如果在心跳停止的危重情况下可快速注射一次本品。其剂量应根据被中和的地高辛量来改变，同时在产品的标签上应有特殊的指导资料。在临床研究期间使用的剂

量平均为400mg (10小瓶)。如果患者由于急性摄入以致中毒，既不能测得血清地高辛浓度，也无法估计其摄入量，建议可给药800mg。

本品推荐的剂量为800mg。在本品从体内完全排泄之前不应再度进行地高辛治疗，对于肾功能正常患者可能需要几天的时间。

本品每小瓶含地高辛特异Fab片段40mg。

* 新适应症和新剂型/新产品 *

除了1986年引入的新治疗药物外，过去使用的几种药物现在增加了新适应症和/或以新剂型或新产品上市。其中最有价值的列于表7。

表7 新增适应症和新剂型/新产品

一般名	商品名	新适应症	(新剂型/产品)
葡萄糖酸洗必泰	四硝酸戊四醇 (Deridex)	龈炎	嗽口剂
色甘酸钠	色甘酸 (Intal)		气雾剂
雌二醇	Estradem		透皮治疗系统(贴膏)
雌激素(口服)		骨质疏松	
鬼白乙叉甙	Vepesid	小细胞癌	
氟哌啶醇癸酸酯	氟哌啶醇癸酸酯 (Haldol decanoate)		长效注射剂
酮康唑	Nizoral	皮癣真菌感染	霜剂
美多心安酒石酸盐	美多心安 (topressor)	心绞痛	
三硝酸甘油酯	Nitrogard		经粘膜吸收片
三硝酸甘油酯	三硝酸甘油酯 (Nitrolingual)		口腔气溶胶喷雾剂
雷米替丁	Zantac	胃与食管的逆流性疾病	
异搏定	Calan SR Isoptin SR	高血压	缓释片

* 酮康唑的片剂和霜剂现在都适用于治疗皮肤真菌的感染。

虽然不作为一种新的单体化合物，但尿促卵泡激素 (Urofollitropin, 商品名: Metrodin, 药厂: Serono) 的上市也是一种值得注意的药品。如同促生育素 (促卵泡激素)，本品含有卵泡刺激素 (FSH)。然而，促生育素还含有某些黄体激素 (LH)，而新产品仅含有微量的黄体激素。

本品可作为治疗不育症 (次于氯芪酚胺) 的二线药物。

新制剂与人体绒毛膜促性腺激素，一起采用连续给药的方法，并用于LH/FSH比值升高或经足够的氯芪酚胺治疗无效的多囊卵巢疾病患者的排卵诱导。

陈焕新译 李德秋 苏开仲校 张紫洞审