

状消失。

小结：1. 本品应避免与酸性药物配伍，以免析出咖啡因。

2. 可视病情调节用量，溴化钠及苯甲酸钠咖啡因的处方量也可做适当调整。

3. 肾功能不全或忌盐患者禁用。

治疗霉菌性肠炎的一种快速疗法

解放军230医院 时德仁 王丽娟 陈明捷 郑莉

自1986年2月至1988年5月，我们用2.5%的制霉菌素溶液保留灌肠治疗老年人肠道霉菌感染30例，结果表明此法疗效显著、疗程短、无不良反应，现报告如下。

临床资料：本组30例因长期用抗生素出现腹泻，便培养确诊为肠道霉菌感染，其中男性24例，女性6例，年龄59~80岁。

治疗方法与结果：0.9%的生理盐水100ml，加入制霉菌素2.5g混均，配成2.5%的制霉菌素盐水溶液，保留灌肠，每晚一次。二天便培养阴转率为60%；三天便培养阴转

率100%。

讨论：老年患者在长期应用抗生素后易并发肠道霉菌感染，虽然口服制霉菌素亦有疗效，但老年患者服药后易有恶心、呕吐等症。对于多疾患的老年人来说，服更多的药物大都不愿接受，加上疗程长，他们多不能坚持服药。而制霉菌素盐水溶液保留灌肠避免了胃肠道不良反应，它能够提高药物在肠道局部的浓度，灭菌力强。本疗法简便、易掌握、疗效高，实为治疗霉菌性肠炎的一种快速疗法。

“珍珠散”治疗局部烧（烫）伤

解放军230医院 顾丽利 陈明捷 杨金凤

1984年以来，我院用自制“珍珠散”治疗局部烧（烫）伤16例，收到良好疗效，特报告如下：

一、临床资料

16例病人中因化学烧伤3例，火焰烧伤10例，其他烫伤3例。面积最小为2%，最大为30%。2例深Ⅱ°，余者均为Ⅲ°。伤后入院时间最短1天，最长30天。

二、药物配方及治法

本配方主要有冰片、血竭、珍珠、朱砂、甘草等，制成粉剂。新鲜创面可直接涂撒于表面，污移或感染创面需用含抗菌素溶液冲洗

后再涂撒。涂撒时应注意：

1. 有水泡处先用注射器抽干，剪掉表面，再涂“珍珠散”。

2. 涂药时应厚薄均匀，轻轻涂撒，不可在创面上抹来抹去。

3. 涂后采取暴露疗法，经常检查创面干燥情况，迟迟不干燥处，可直接重复涂撒药。

三、疗效及典型病例介绍

涂药后创面逐渐干燥、结痂，痂脱掉后创面恢复为治愈，本组16例均治愈。创面干燥结痂时间最短2天，最长7天，平均为3.5