

可认为二者相互抵消。

2. 图Ⅲ在260~300℃±的特征峰与图Ⅱ对比,有些改变,如图Ⅲ放热峰的起始温度降低以及在280℃处与图Ⅱ相对应的一个小的吸热峰消失,且整个放热峰增大,经分析可以看出图Ⅰ从200℃开始到320℃±有缓慢放热趋势,加之吸热远远小于放热,因此,这一区域特征峰有所改变完全是囊材和主药峰叠加的缘故。

综上所述,我们认为:用国产CDR-I型差热分析仪考查呋喃妥因缓释微囊的结论为:囊材明胶对主药呋喃妥因没有影响。

讨 论



· 文摘 ·

长 压 定 生 发 液 新 处 方

贾丹兵译

张紫洞校

2%长压定(Minoxidil)现在已由普强药厂(Upjohn Company)制成局部用溶液以“落建”(Regaine)商品名上市。本品适用于治疗男性秃发,特别是头顶秃发,业已证明它可以刺激头发的生长,尽管作用机理尚不明瞭。局部应用长压定最常见的不良反应是在皮肤,这包括各种类型的皮炎和瘙痒,较少见的副作用则有眩晕和头痛。

局部应用长压定的推荐剂量是1ml,每日两次,必须涂擦于头皮区域。在每次应用前拟涂药部位应

干燥。每日最大的推荐剂量是2ml,应告知病人在治疗四个月后头发生长才明显。同时也应劝告病人,开始时头发的生长也许是稀薄而细微的,但最终将会变得浓厚,而且病人头发的颜色也会变深。如果病人停用“落建”,已经长出的新发可能会脱落。

商品“落建”(2%长压定局部溶液)供应包装规格为20mg/ml,每瓶的售价是53.17美元。

[hospital Pharmacy《医院药学》, 23(11); 1038, 1988(英文)]

乙 酰 螺 旋 霉 素 片 过 敏 反 应 一 例

南京空军医院

周晓南 冯亚英

门诊患者××、男,70岁,主诉咳嗽胸闷右下肋痛,发烧38.8℃,咽部红肿,扁桃体、心脏等正常。肺听诊右下部呼吸音略低但未听到干湿罗音,胸透诊断为:右下肺炎症。有青霉素过敏史。用葡萄糖氯化钠注射液500ml+庆大霉素24万u静滴3天,服用氯棕合剂、扑热息痛等对症治疗。后又连续用上述液体静滴3天,其间进行拍片,结果:间质性肺炎。考虑到患者年龄较大及庆大霉素对耳毒性的影响,故改口服乙酰螺旋

霉素,每日0.6g,分3次服。3日后患者左前臂感觉奇痒、发红,皮肤出现颗粒样粗糙,翌日颗粒处全部出现水泡,如蚕豆大小,并有部分破溃流水,同时,左前臂及两下肢大腿近膝部皮肤也产生上述症状。患者来院诊治,诊断为乙酰螺旋霉素过敏。令患者停药并给予维生素C片,赛庚啶口服,外擦复方康纳乐霜及复方锌油。2日后水泡处逐渐干燥,搔痒停止,一周后基本痊愈,半月后皮肤红色消退,恢复正常。