

参考文献

[1]周自永等. 新编常用药物手册. 第二版. 北京: 金盾出版社, 1992: 457

[2]王印其等. 实用眼科杂志, 1993; 11(12): 759

[3]杨德旺. 眼科治疗学. 北京: 人民卫生出版社, 1983: 47

[4]StanSon S. Arch Ophthalmol 1986; 104: 1287

止痛消炎膏合地塞米松治疗外痔 23 例

孙建新

(扬州市红十字会医院痔瘻科 扬州 225001)

止痛消炎膏是上海集成药厂生产的以中药为主要成分的消肿止痛药, 由于其配方合理, 外用范围较广。笔者根据其药物作用分析, 近两年来在该药膏加入少量地塞米松粉用于外痔炎症治疗, 共观察 23 例病人, 获得满意效果。

一、一般资料

本组 23 例病人, 男性 16 例, 女性 7 例, 年龄 20~70 岁。按文献^[1,2]诊断, 其中炎性外痔 13 例, 血栓性外痔 10 例, 所有病例均为急性炎症水肿及血栓形成早期。

二、治疗方法

患者先以 1:5000 高锰酸钾溶液或洁尔阴溶液坐浴(温热浴), 每次 15~20 分钟。熏洗后取侧卧位, 按外科换药常规再次消毒肛部, 嘱患者放松肛门充分暴露, 然后根据痔体大小截取无菌敷料, 将适量止痛消炎膏与地塞米松 0.37~0.75mg(用 0.75mg 片剂 1 片研成细粉取半量至全量)充分混合均匀涂于无菌敷料形成 1~2 毫米薄层, 敷盖患处, 外用胶布固定, 每日 1~2 次, 5 天为一疗程, 病情较重者可继续治疗 2~3 天。按文献^[1]治愈好转标准判定治疗效果。

三、治疗结果

按上述方法治疗观察 23 例, 结果治愈 20 例, 好转 3 例, 治愈率 86.96%, 有效率 100%。治疗时间最长为 8 天, 最短为 3 天, 平均 5.5 天, 一般用药 2 天见效。治疗期间有 3

例病人水肿较重, 用口服或肌注抗菌药 3~5 天加强治疗, 余均未加用其他抗菌药物。使用止痛消炎膏合地塞米松均无局部或全身不良反应。

四、讨论

本组采用的止痛消炎膏系由独活、生天南星、生草乌、皂荚、冰片、冬绿油、硫酸钠等药物与有关辅料组成。这些药物多善行血分, 活动气血, 散寒止痛, 泻火软坚, 具有活血化瘀, 消肿止痛, 抗菌防腐功效。用于外痔炎症治疗既针对痔疮发病机理, 又符合痔疮药物治疗; 加之地塞米松有较强的抗炎、抗毒素作用, 可减少充血, 降低毛细血管通透性, 与止痛消炎膏互相配合, 更加速了痔疮急性炎症水肿的消退及血栓的吸收、消散。根据临床观察, 病人敷贴混合药膏后, 疼痛缓解较快, 局部炎性水肿消退及血栓消散都比一般局部用药为佳, 疗程缩短 2~3 天, 减少了抗菌素大剂量应用与反复注射的痛苦, 避免了药物不良反应的发生, 而且明显地提高了治愈率。止痛消炎膏使用安全, 价格低廉, 地塞米松用量又很小, 可用其片剂磨细调用, 整个治疗操作简便易行, 不失为外痔急性炎症治疗一个有效药剂, 值得进一步研究观察。

参考文献

[1]孙传兴主编. 临床疾病诊断依据治愈好转标准. 第 1 版. 北京: 人民军医出版社, 1991: 648

[2]陈贵廷, 薛赛琴编. 最新国内外疾病诊断标准. 第 1 版. 北京: 学苑出版社, 1991: 854